

## MATERIAL ADICIONAL

Tabla 1 del material adicional

	Grupos de estudio				Total (n = 428)	p
	RFF+/dPR+ (n = 93)	RFF+/dPR- (n = 35)	RFF-/dPR+ (n = 43)	RFF-/dPR- (n = 257)		
<i>Sexo (hombre)</i>	86 (92,5%)	29 (82,9%)	30 (69,8%)	195 (75,9%)	340 (79,4%)	0,002
<i>Edad (años)</i>	63,9 ± 10,9	64,9 ± 8,4	68,8 ± 10,3	66,2 ± 10,6	65,9 ± 10,6	0,062
<i>IMC</i>	27,5 ± 5,5	28,3 ± 4,0	28,4 ± 5,0	28,0 ± 4,4	28,0 ± 4,7	0,728
<i>Fumador</i>						0,633*
No se sabe	8 (8,9%)	4 (11,8%)	6 (14,0%)	15 (6,0%)	33 (7,9%)	
Activo	22 (24,4%)	5 (14,7%)	6 (14,0%)	54 (21,6%)	87 (20,9%)	
Exfumador	37 (41,1%)	16 (47,1%)	17 (39,5%)	108 (43,2%)	178 (42,7%)	
Nunca	23 (25,6%)	9 (26,5%)	14 (32,6%)	73 (29,2%)	119 (28,5%)	
<i>Hipertensión arterial</i>	69 (76,7%)	18 (52,9%)	37 (88,1%)	155 (62,5%)	279 (67,4%)	0,001
<i>Dislipidemia</i>	67 (73,6%)	21 (61,8%)	27 (67,5%)	151 (60,6%)	266 (64,3%)	0,160
<i>Diabetes mellitus</i>	34 (37,4%)	10 (29,4%)	21 (50,0%)	72 (28,8%)	137 (32,9%)	0,037
<i>Arteriopatía periférica</i>	17 (18,9%)	3 (8,6%)	5 (11,6%)	19 (7,6%)	44 (10,5%)	0,027*
<i>Síndrome coronario agudo previo</i>	30 (32,6%)	14 (40,0%)	16 (37,2%)	70 (27,6%)	130 (30,7%)	0,306
<i>Ictus previo</i>	3 (3,3%)	2 (5,7%)	0 (0,0%)	9 (3,6%)	14 (3,3%)	0,541*
<i>Cirugía bypass previa</i>	2 (2,2%)	2 (5,7%)	0 (0,0%)	3 (1,2%)	7 (1,7%)	0,195*
<i>Insuficiencia cardiaca/ disfunción</i>	10 (10,9%)	3 (8,6%)	12 (27,9%)	43 (16,9%)	68 (16,0%)	0,048
<i>Valvulopatía</i>	5 (5,4%)	1 (2,9%)	6 (14,0%)	14 (5,5%)	26 (6,1%)	0,141*
<i>Fibrilación auricular</i>	14 (15,4%)	3 (8,6%)	7 (16,7%)	40 (15,9%)	64 (15,2%)	0,717
<i>Fracción de eyección por ecocardiografía</i>						0,052*
< 30%	4 (4,6%)	0 (0,0%)	7 (17,1%)	22 (9,3%)	33 (8,3%)	
30-50%	12 (13,8%)	4 (11,4%)	9 (22,0%)	38 (16,1%)	63 (15,8%)	
≥ 50%	71 (81,6%)	31 (88,6%)	25 (61,0%)	176 (74,6%)	303 (75,9%)	
<i>EAC angiografía</i>						< 0,001*
EAC × 1	36 (39,56)	17 (48,57)	22 (51,16)	161 (62,65)	236 (55,40)	
EAC × 2	26 (28,57)	14 (40,00)	14 (32,56)	70 (27,24)	124 (29,11)	
EAC × 3	27 (29,67)	4 (11,43)	5 (11,63)	24 (9,34)	60 (14,08)	
TCI + EAC	2 (2,20)	0 (0)	2 (4,65)	2 (0,78)	6 (1,41)	
<i>Segmento BARI</i>						< 0,001*
Coronaria derecha	8 (8,60)	12 (36,36)	5 (11,63)	58 (22,83)	83 (19,62)	
Descendente anterior	76 (81,72)	18 (54,55)	35 (81,40)	142 (55,91)	271 (64,07)	
Circunfleja	9 (9,98)	3 (9,09)	3 (6,98)	54 (21,26)	69 (16,31)	
<i>Presentación clínica</i>						0,55
Dolor torácico	45 (48,91)	18 (51,43)	17 (39,53)	129 (51,19)	209 (49,53)	

SCA	34 (36,96)	11 (31,43)	17 (39,53)	72 (28,57)	134 (31,75)	
Otras	13 (14,13)	6 (17,14)	9 (20,93)	51 (20,24)	79 (18,72)	
<i>Longitud (mm)</i>						< 0,001
< 20	40 (45,98)	13 (39,39)	27 (65,85)	177 (71,66)	257 (62,99)	
≥ 20	47 (54,02)	20 (60,61)	14 (34,15)	70 (28,34)	151 (37,01)	
<i>DLR (mm)</i>						0,23*
≤ 2,5	17 (19,32)	10 (31,25)	9 (21,43)	39 (15,92)	75 (18,43)	
2,5-3,5	66 (75)	19 (59,38)	28 (66,67)	174 (71,02)	287 (70,52)	
≥ 3,5-4	5 (5,68)	3 (9,38)	5 (11,90)	32 (13,06)	45 (11,06)	
<i>Estenosis (%)</i>						< 0,001*
≤ 45	4 (4,40)	0 (0)	3 (7,14)	33 (12,99)	40 (9,52)	
45-55	24 (26,37)	8 (24,24)	24 (57,14)	147 (57,87)	203 (48,33)	
≥ 55	63 (63,23)	25 (75,76)	15 (35,71)	74 (29,13)	177 (42,14)	
<i>Calcificación</i>						< 0,001
Ligera	30 (32,61)	15 (42,86)	26 (60,47)	148 (58,50)	219 (51,77)	
Moderada	34 (36,96)	15 (42,86)	11 (25,58)	69 (27,27)	129 (30,50)	
Grave	28 (30,43)	5 (14,29)	6 (13,95)	36 (14,23)	75 (17,73)	
<i>Tortuosidad</i>						0,55*
Ligera	57 (63,33)	23 (65,71)	25 (59,52)	173 (68,65)	278 (66,35)	
Moderada	30 (33,33)	12 (34,29)	14 (33,33)	72 (28,57)	128 (30,55)	
Grave	3 (3,33)	0 (0)	3 (7,14)	7 (2,78)	13 (3,10)	

BARI: *Bypass Angioplasty Revascularization Investigation*; DLR: diámetro luminal de referencia; EAC: enfermedad arterial coronaria; IMC: índice de masa corporal; SCA: síndrome coronario agudo; TCI: tronco común izquierdo.

\*Valores que pueden ser incorrectos por falta de datos en al menos un grupo (n < 6).